

# Bases de l'Arithmétique & Cryptologie Romantique

# Exercice 9 – Indice de coïncidence mutuelle

1. Sachant que le texte suivant a été chiffré en utilisant une **clé de taille 4** et le cryptosystème de Vigenère, retrouvez le texte clair en utilisant la table des indices de coïncidence mutuelle suivante.
  - **Rappels:** Indice de coïncidence mutuelle: distingue **l'aléatoire** sur deux textes.
    - Attaque sur *la clef*.
  - L'ICM entre deux textes  $t_1$  et  $t_2$  est la probabilité de tirer au hasard la *même lettre* dans  $t_1$  et  $t_2$

$$ICM = \sum_{i=0}^{25} \frac{m_i n_i}{m n}$$

avec:  $m_i$ : nombre de caractères  $c_i$  dans  $t_1$   
 $n_i$ : nombre de caractères  $c_i$  dans  $t_2$

$m$ : taille de  $t_1$   
 $n$ : taille de  $t_2$

# Exercice 9 – Indice de coïncidence mutuelle

- Explication sur la construction tableau:
  - Le texte est d'abord découpé en **4 colonnes** (taille de la clef):
  - On calcule ensuite l'ICM entre une colonne  $i$  (**référence de l'aléatoire**) et une colonne  $j$  à laquelle on applique les **25 permutations** de l'alphabet.

0	1	2	3
W	W	W	J
J	R	K	Y
T	B	X	F
D	Z	H	T
...	...	...	...

→ A la bonne permutation sur  $j$ : **IMC élevé!**

- On a trouvé le bon décalage entre la colonne  $i$  et  $j$  pour avoir un texte

qui n'est **pas aléatoire**.

“ICM entre  $s_i$  et  $Dec(s_j, d)$ ”  
=

“ICM entre la colonne  $i$  et  
décalage de la colonne  $j$   
pour la lettre  $d$ ”

$i$	$j$	Indice de coïncidence mutuelle entre $s_i$ et $Dec(s_j, d)$ avec $d = 0, \dots, 25$																									
0	1	0.034	<u>0.064</u>	0.038	0.042	0.027	0.041	0.040	0.031	0.031	0.034	0.039	0.029	0.045	0.028	0.041	0.033	0.047	0.035	0.037	0.034	0.044	0.046	0.032	0.052	0.031	0.031
		0.053	0.043	0.044	0.025	0.035	0.050	0.042	0.035	0.027	0.033	0.044	<u>0.063</u>	0.041	0.033	0.027	0.042	0.037	0.033	0.033	0.035	0.036	0.029	0.040	0.032	0.043	0.034
0	3	0.024	0.029	0.039	<u>0.063</u>	0.045	0.028	0.026	0.047	0.034	0.035	0.036	0.038	0.032	0.029	0.045	0.043	0.041	0.034	0.047	0.040	0.031	0.029	0.037	0.054	0.042	0.037
		0.036	0.034	0.028	0.040	0.041	0.041	0.034	0.038	0.044	0.040	<u>0.063</u>	0.043	0.032	0.030	0.044	0.039	0.034	0.038	0.035	0.027	0.027	0.042	0.039	<u>0.037</u>	0.033	0.049
1	3	0.036	0.040	<u>0.065</u>	0.042	0.024	0.029	0.046	0.037	0.029	0.046	0.040	0.021	0.033	0.050	0.046	0.031	0.033	0.049	0.031	0.030	0.037	0.048	0.038	0.034	0.040	0.030
		0.023	0.024	0.043	0.044	0.050	0.039	0.043	0.040	0.025	0.034	0.027	0.045	0.035	0.045	0.041	0.023	0.034	0.043	<u>0.076</u>	0.040	0.025	0.031	0.032	0.045	0.034	0.048

# Exercice 9 – Indice de coïncidence mutuelle

- Exemple pour  $i = 0$  et  $j = 1$

Si on permute une fois la colonne  $j$ , on obtient un IMC élevé.

(Rappel: IMC invariant par chiffrement par substitution.)

$i$	$j$	Indice de coïncidence mutuelle entre $s_i$ et $\text{Dec}(s_j, d)$ avec $d = 0, \dots, 25$																									
0	1	0.034	<u>0.064</u>	0.038	0.042	0.027	0.041	0.040	0.031	0.031	0.034	0.039	0.029	0.045	0.028	0.041	0.033	0.047	0.035	0.037	0.034	0.044	0.046	0.032	0.052	0.031	0.031
0	2	0.053	0.043	0.044	0.025	0.035	0.050	0.042	0.035	0.027	0.033	0.044	<u>0.063</u>	0.041	0.033	0.027	0.042	<u>0.037</u>	0.033	0.033	0.035	0.036	0.029	0.040	0.032	0.043	0.034
0	3	0.024	0.029	0.039	<u>0.063</u>	0.045	0.028	0.026	0.047	0.034	0.035	0.036	0.038	0.032	0.029	0.045	0.043	0.041	0.034	0.047	0.040	0.031	0.029	0.037	0.054	0.042	0.037
1	2	0.036	0.034	0.028	0.040	0.041	0.041	0.034	0.038	0.044	0.040	<u>0.063</u>	0.043	0.032	0.030	0.044	0.039	0.034	0.038	0.035	0.027	0.027	0.042	0.039	0.037	0.033	0.049
1	3	0.036	0.040	<u>0.065</u>	0.042	0.024	0.029	0.046	0.037	0.029	0.046	0.040	0.021	0.033	0.050	0.046	0.031	0.033	0.049	0.031	0.030	0.037	0.048	0.038	0.034	0.040	0.030
2	3	0.023	0.024	0.043	0.044	0.050	0.039	0.043	0.040	0.025	0.034	0.027	0.045	0.035	0.045	0.041	0.023	0.034	0.043	<u>0.076</u>	0.040	0.025	0.031	0.032	0.045	0.034	0.048

- Combien de permutation sur la 3ème colonne doit-on effectuer pour ne plus avoir un texte aléatoire? *3 permutations -*
- On peut résumer cela en systèmes:

(1)  $d_0 - d_1 = 1$

(2)  $d_0 - d_2 = 11$

(3)  $d_0 - d_3 = 3$

(4)  $d_1 - d_2 = 10$

(5)  $d_1 - d_3 = 2$

(6)  $d_2 - d_3 = 18$

# Exercice 9 – Indice de coïncidence mutuelle

$$\begin{aligned}d_0 - d_1 &= 1 \\d_0 - d_2 &= 11 \\d_0 - d_3 &= 3 \\d_1 - d_2 &= 10 \\d_1 - d_3 &= 2 \\d_2 - d_3 &= 18\end{aligned}$$

- Des trois premières équations, on déduit:

$$d_1 = d_0 - 1 \quad d_2 = d_0 - 11 \quad d_3 = d_0 - 3$$

- On injecte ces résultats dans les trois suivantes:

$$d_1 - d_2 = (d_0 - d_2) - (d_0 - d_1) = 10$$

$$d_1 - d_3 = (d_0 - d_3) - (d_0 - d_1) = 2$$

$$d_2 - d_3 = (d_0 - d_3) - (d_0 - d_2) = -8 = 18 \pmod{26}$$

→ Le système est cohérent.

- Il reste à trouver la valeur de  $d_0$ : on calcule dans la colonne 0 la lettre la plus fréquente, il y a des chances alors qu'il s'agisse de E.
- On en déduit ensuite la valeur du décalage  $d_0$ , puis  $d_1$ ,  $d_2$ ,  $d_3$  et donc **la clef**.

→ Dans le texte il y a deux lettres les plus fréquentes: le C et le T. (10 fois chacune)

# Exercice 9 – Indice de coïncidence mutuelle

Rappels:

$$\begin{aligned}d_1 &= d_0 - 1 \\d_2 &= d_0 - 11 \\d_3 &= d_0 - 3\end{aligned}$$

→ Si C est le chiffré de E dans la colonne 0:

◆ alors  $d_0 = C - E = -2 = 24 \pmod{26}$

◆ d'où:  $d_1 = 23$                        $d_2 = 13$                        $d_3 = 21$

◆ La clef est donc:  $YXNV$

→ Si T est le chiffré de E dans la colonne 0:

◆ alors  $d_0 = T - E = 15$

◆ d'où:  $d_1 = 14$                        $d_2 = 4$                        $d_3 = 12$

◆ La clef est donc:  $POEM$

# Exercice 9 – Indice de coïncidence mutuelle

→ Si la clef est YXNV:

YZJALUXDVEKKFCUYZDKYRKCFEXIFDREKZTGFVDJUUGVEUDFIVLGFEEZETZUVEKKYREZEJGZ  
IRKZFEREUKYRKKFLKKVIKYVGFVKIPFWIFDRETVCPIZTJNFLCUJLWWZTVYVETVYZJKYVFIP  
TCVRICPWZKKVUKFYZJFNECZDZKRKZFEJKYRKRCFEXGFVDZJRWCRTFEKIRUZTKZFEZEKVI  
DJKYVTFDGFEEVEKJFWKYVIRMVERIVWVNREUJZDGCVRDRERSZIUUREUKYVGYREKRJDRCDVDFI  
PRKRNFRE

→ Si la clef est POEM:

HISJUDGMENTTOLDHIMTHATLONGROMANTICPOEMSDEPENDMOREUPONINCIDENTTHANINSPI  
RATIONANDTHATTOUTTERTHEPOETRYOFROMANCELYRICSWOULD SufficeHENCEHISTHEORY  
CLEARLYFITTEDTOHISOWNLIMITATIONSTHATALONGPOEMISAFLATCONTRADICTIONINTER  
MSTHECOMPONENTSOFTHERAVENAREFEWANDSIMPLEAMANABIRDANDTHEPHANTASMA MEMOR  
YATAWOMAN

# Exercice 11 – Inversion modulaire

1. Rappeler la définition de l'anneau  $A = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ .

- **Définition d'un anneau:**  $A$  est un anneau  $\Leftrightarrow A$  est un ensemble muni de deux lois de compositions internes notées  $+$  et  $\times$ , tels que:
  - $(A, +)$  est un groupe abélien dont le neutre sera noté  $0$
  - La loi  $\times$  est associative:  $\forall a, b, c \in A, a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$
  - La loi  $\times$  possède un élément neutre noté  $1_A$
  - La loi  $\times$  est distributive à gauche et à droite par rapport à la loi  $+$ :  
 $\forall a, b, c \in A, a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
- Lorsque la loi  $\times$  est commutative, on dit que l'anneau est commutatif.

→  $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$  est l'ensemble des restes possibles de la division euclidienne par 7.

# Exercice 11 – Inversion modulaire

1. Donner la table d'addition et de multiplication de A. L'anneau A possède-t-il des diviseurs de zéro ? Est-il intègre ? Est-il un corps ?

• Définition: Un anneau commutatif unitaire  $(A, +, \times)$  est **intègre** s'il est:

○ différent de l'anneau nul

○ sans diviseur de zéro:  $\forall a, b \in A^2: a \times b = 0 \Rightarrow a = 0$   
ou  $b = 0$

→ Il n'y a aucun  $a \times b = 0$  donc A est un anneau intègre

• Définition: **Un corps** est un ensemble muni de 2 opérations rendant possible l'addition, la soustraction, la multiplication et le calcul d'opposés et d'inverses. Tous les éléments sont

→ A est un corps\_

inversibles

inverses:

*	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

opposés:

+	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

# Exercice 11 – Inversion modulaire

1. Quelle est la différence majeure entre  $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$  ?

- $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$  est-il un anneau intègre ? Est-il un corps ?

→  $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$  a des diviseurs de 0 puisque :  $2 \times 13 = 0$  et  $2 \neq 0$  et  $13 \neq 0$   
→  $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$  n'est pas un anneau intègre donc pas un corps.

2. Donner la définition d'un cryptosystème par chiffrement affine avec  $P = C = A$ .  
Quelle est la différence principale avec le cas où  $P = C = \mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$  ?

- **Rappels:**  $P$  et  $C$  sont les alphabets pour écrire les messages clairs et chiffrés respectivement.  $K$  l'ensemble des clefs possibles. Pour tout  $K \in K$  on peut définir deux applications  $e_K : P \rightarrow C$  (Encryption) et  $d_K : C \rightarrow P$  (Decryption) telles que  $d_K(e_K(x)) = x$  pour tout  $x \in P$ .

- $P = C = A$ ,  $\forall (a, b) \in K$ ,  $e_K(x) = ax + b \pmod{26}$  et  $d_K(y) = a^{-1}(y - b) \pmod{26}$

# Exercice 11 – Inversion modulaire

3. (**Chiffrement de Hill**) Le cryptosystème poly-alphabétique de Hill que nous allons étudier ici permet de chiffrer des données de deux caractères de l'alphabet  $Z/7Z$ . Une clé  $K$  sera représentée par une matrice  $2 \times 2$  à coefficients dans  $Z/7Z$  et la fonction de chiffrement correspondante sera l'application de  $K$  sur un vecteur de deux caractères. Donner la représentation formelle de ce cryptosystème comme nous l'avons vu en cours. Quelle caractéristique doit avoir la matrice  $K$  pour que le cryptosystème soit valide ?

- **Rappel:** Chiffrement de Hill ?

$P = C = A \times A$  et  $K \subseteq M_2(A)$  : à  $v$ , on associe  $e_K(v) = Kv$

→ le produit du vecteur  $v$  par la matrice  $K$ .

Pour pouvoir calculer  $v = d_K(e_K(v))$  à partir de  $e_K(v)$ , il faut que la matrice  $K$  soit **inversible**.

# Exercice 11 – Inversion modulaire

## 3. Chiffrement de Hill

- Les lettres sont remplacées par leur rang dans l'alphabet, les lettres  $P_k$  et  $P_{k+1}$  du texte clair seront chiffrées  $C_k$  et  $C_{k+1}$  selon la formule:

$$\begin{pmatrix} C_k \\ C_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_k \\ P_{k+1} \end{pmatrix} \pmod{26}$$

- Le chiffrement obtenu est donc:

- $C_k = a P_k + b P_{k+1}$

- $C_{k+1} = c P_k + d P_{k+1}$

- Exemple: soit la clef  $\begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ , on veut chiffrer 'je':  $J : 10$   
 $E : 5$

$$C_1 = 9 \times 10 + 4 \times 5 \pmod{26} = 6$$

$$C_2 = 5 \times 10 + 7 \times 5 \pmod{26} = 7$$

J devient F  
E devient G

# Exercice 11 – Inversion modulaire

## 3. Déchiffrement de Hill

- Selon le même principe on prend les lettres 2 à 2, avec la formule:

$$\begin{pmatrix} P_k \\ P_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} C_k \\ C_{k+1} \end{pmatrix} \pmod{26}$$

- Avec  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Rappel:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{com} A$$

- Quelle propriété doit-on avoir sur K pour que K soit inversible ?  $\det(K) \neq 0!$

## Exercice 11 – Inversion modulaire

3. Le cryptosystème poly-alphabétique de Hill que nous allons étudier ici permet de chiffrer des données de deux caractères de l'alphabet  $Z/7Z$ . Une clé  $K$  sera représentée par une matrice  $2 \times 2$  à coefficients dans  $Z/7Z$  et la fonction de chiffrement correspondante sera l'application de  $K$  sur un vecteur de deux caractères. Donner la représentation formelle de ce cryptosystème comme nous l'avons vu en cours. Quelle caractéristique doit avoir la matrice  $K$  pour que le cryptosystème soit valide ?

→  $P = C = A$  et  $K \subseteq M_2(A)$  : à  $v$ , on associe:  $\mathcal{E}_K(v) = Kv$

Pour pouvoir calculer:  $v = d_K(\mathcal{E}_K(v))$

il faut que:  $K$  soit inversible.

# Exercice 11 – Inversion modulaire

4. Montrer que l'ensemble des matrices  $2 \times 2$  sur un anneau  $A$  forme lui-même un anneau et que le sous-ensemble des matrices inversibles est un groupe pour la multiplication.

- Un anneau est un ensemble doté de deux lois de composition interne, l'une additive notée  $+$  et l'autre multiplicative notée  $\times$ .
- L'addition est commutative, associative, admet un élément neutre et tout élément de l'anneau admet un opposé pour l'addition.
- La multiplication est associative, distributive par rapport à l'addition et admet un élément neutre.

→ a. Soient  $X, Y, Z \in M_2(A)$  tels que  $X = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} Z = \begin{pmatrix} a_3 & b_3 \\ c_3 & d_3 \end{pmatrix}$

$$X + Y = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix} \quad \text{et } X \times Y = \begin{pmatrix} a_1 a_2 + b_1 c_2 & a_1 b_2 + b_1 d_2 \\ c_1 a_2 + d_1 c_2 & c_1 b_2 + d_1 d_2 \end{pmatrix}$$

→  $M_2(A)$  est stable par addition et multiplication de matrices.

# Exercice 11 – Inversion modulaire

4. b. L'addition est commutative, associative, admet un élément neutre et tout élément de l'anneau admet un opposé pour l'addition.

$$\rightarrow X + Y = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 + a_1 & b_2 + b_1 \\ c_2 + c_1 & d_2 + d_1 \end{pmatrix} = Y + X$$

$$\rightarrow \text{De la même manière: } (X + Y) + Z = X + (Y + Z)$$

$$\rightarrow \text{Élément neutre pour l'addition: } 0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{Quelle que soit } M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ alors la matrice } -M = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix} \text{ est son opposé.}$$

# Exercice 11 – Inversion modulaire

4. c. La multiplication est associative, distributive par rapport à l'addition et admet un élément neutre.

→ Associativité: Il suffit de calculer  $(X * Y) * Z$  et  $X * (Y * Z)$  : on retrouve le même résultat!

→ Distributivité: Il suffit de calculer:  $X * (Y + Z)$  et  $X * Y + X * Z$  : on retrouve le même résultat aussi.

→ Élément neutre pour la multiplication:  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

→  $M_2(A)$  est un anneau !

→ Le sous-ensemble des matrices inversibles est un groupe pour la multiplication car *chaque élément possède un inverse!*

# Exercice 11 – Inversion modulaire

5. Montrer que, lorsqu'elle existe, l'inverse d'une matrice  $A$  peut être calculée par la matrice complémentaire:

$$B = A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

- Remarque: si l'anneau  $A$  est intègre alors l'anneau  $M_2(A)$  l'est aussi car  $\det AB = \det A \det B$  et  $A$  inversible est équivalent à  $\det A \neq 0$

Mais ici on travaille dans  $A = \mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$  qui n'est pas intègre.

→ On calcule le produit  $AB$ :  $AB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \frac{1}{\det A} \times \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

$$= \frac{1}{\det A} \times \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \times \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \times \begin{pmatrix} \det A & 0 \\ 0 & \det A \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

## Exercice 11 – Inversion modulaire

→ On calcule le produit BA:  $BA = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$$= \frac{1}{\det A} \times \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

- Donc si  $\det(A) = ad - bc \neq 0$ , alors A est inversible et  $B = A^{-1}$
- Si  $\det(A) = 0$ , alors A n'est pas inversible

# Exercice 11 – Inversion modulaire

6. D duire de la question pr c dente un moyen de reconna tre une matrice inversible. Donner alors une nouvelle sp cification du chiffrement de Hill, exhiber un exemple de chiffrement et d chiffrement pour une cl  bien choisie.

→ On vient de voir que  $A$  est inversible  $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

→ Pour le chiffrement de Hill: On chiffre successivement des blocs de 2 caract res selon une matrice inversible modulo 7 de taille  $2 \times 2$  en multipliant chaque bloc de 2 caract res par cette matrice.

→ Exemple: soit la matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  avec  $\det(A) = 2 \times 2 - 1 \times 3 = 1 \neq 0$   
A est inversible modulo 7.

On chiffre le mot '123456': on le d coupe en blocs repr sent s par des vecteurs:

$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$  et on multiplie chacun des vecteurs par A:

$$v_1 \times A = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \pmod{7} \quad v_2 \times A = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \pmod{7} \quad v_3 \times A = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \pmod{7}$$

Donc le chiffr  de '123456' est

154403